



**Gefeliciteerd
met je nieuwe pup!**





Algemene informatie

Gefeliciteerd met je nieuwe pup! Je gaat een spannende en leuke tijd tegemoet. Je hebt vast al veel gelezen over het ras, de opvoeding en de eerste dagen bij je thuis. Maar heb je je ook al ingelezen in de gezondheid van je pup?

De gezondheid en het welzijn van je puppy is afhankelijk van de verzorging die je hem geeft.

Je kunt namelijk zelf een hoop doen om je pup zo gezond mogelijk te laten opgroeien zoals:

- Het bieden van rust, een eigen plaats
- Zorgen voor goede voeding
- Een correcte hygiëne toepassen
- Tijdig laten inenten
- Behandelen tegen vlooien, teken en wormen
- En niet te vergeten, een consequente opvoeding

In dit boekje vind je meer informatie over parasietenbestrijding. Voor je pup is het een jungle daarbuiten! Van bijtende vliegende beestjes, wormen tot enge kruipers die een hond de kriebels geven. Lees alles dat je moet weten over parasieten die een hond allemaal kan tegenkomen en hoe je dit kunt voorkomen. Voor uitgebreide informatie ga naar www.bayerpetcare.nl

We wensen je vooral veel plezier in deze leuke tijd!

Het Bayer Petcare team.

WORMEN EN WAAROM ONTWORMEN ZO BELANGRIJK IS

Wormen zijn parasieten die in het lichaam van je huisdier leven. Vaak verschuilen ze zich diep in de darmen. Daar vermenigvuldigen ze zich. Ze voeden zich ten koste van je dier. Je ziet ze vermoedelijk pas als je dier al erg besmet of verzwakt is.

Wormen worden ingedeeld in de groepen lintwormen en rondwormen. Onder rondwormen vallen weer zweep-, spoel- en haakwormen.

Lintwormen zijn het minst gevaarlijk, pas bij ernstige besmetting kunnen gezondheidsrisico's optreden. Lintwormen zien eruit als lange, platte linten of stroken, verdeeld in segmenten. Volwassen lintwormen komen voor in de dunne darm. Eénmaal volgroeid laat de lintworm segmenten met eitjes los die in de ontlasting van de hond terecht komen en daar ook in te zien zijn (ze zien eruit als kleine, witte, krioelende 'rijstkorrels'!).

Rondwormen zijn grote, witte wormen met een buisvormig lichaam. De volwassen rondworm komt voor in de dunne darm en leeft daar van de darminhoud.



Lintworm



Rondworm

Als je van plan bent om je hond mee op vakantie te nemen, is het verstandig om even bij je dierenarts te informeren of een extra ontworming van je pup nodig is. In sommige warme landen zijn er bijvoorbeeld haakwormen die ook op mensen overgedragen kunnen worden.

Puppies kunnen geïnfecteerd raken met rond- en lintwormen via de zogende moeder, dus vandaar dat puppies vaker ontwormd moeten worden dan volwassen honden.

Waarom je puppy ontwormen?

Om je hond, maar ook jezelf, gezond te houden, is het belangrijk dat je hem goed ontwormt. Informeer bij de fokker naar de behandelingen die al zijn gegeven. Pups met een overdreven dikke buik zijn verdacht. Hoewel de buik van een puppy ook na het drinken op kan zetten, wijst een overdreven dikke buik vaak op wormen.

Wat zijn de symptomen?


Wormen zijn vooral voor pups gevaarlijk. Naast een opgeblazen buik zijn diarree (soms met bloed), braken, een doffe vacht, huiduitslag, groeiachterstand, zwakte, vermagering, het met het achterste over de grond schuiven en 'rijstkorrels' ter hoogte van de anus aanwijzingen die op wormen kunnen duiden. Ga bij twijfel altijd naar een dierenarts.

Hoe kan mijn hond wormen krijgen?

Honden raken besmet door het eten van een geïnfecteerde tussengastheer. Ze moeten, zeker in het eerste levensjaar, regelmatig worden behandeld tegen lintwormen als ze regelmatig buiten jagen of buiten lopen, of in contact komen met karkassen van dieren – zoals honden op de boerderij. Een vlo is de tussengastheer voor de meest voorkomende lintworm bij honden, dus zelfs huishonden kunnen besmet raken door de vlooiën die ze binnenkrijgen.



Wormen kunnen uw huisdier op verschillende manieren infecteren.



Hoe vaak moet je ontwormen?

Hoe vaak je moet ontwormen, hangt van de leeftijd van je hond af. Gangbaar is dat een puppy op de leeftijd van 2, 4, 6, 8 en 12 weken ontwormd wordt. Als het goed is, doet de fokker dit al voor je. Daarna wordt aangeraden om hem tot de leeftijd van 6 maanden om de maand te ontwormen. Vervolgens wordt elke 3 maanden ontwormen aangeraden. Als je meerdere dieren in huis hebt, is het ook handig om ze allemaal tegelijk te ontwormen, zodat ze elkaar na het ontwormen niet meteen weer besmetten.

Het aanbevolen ontwormingsschema volgens ESCCAP

Ontwormingsadvies voor honden

Leeftijd	Ontworming
2 weken	1e keer
4 weken	2e keer
6 weken	3e keer
8 weken	4e keer
12 weken	5e keer
4 maanden	6e keer
5 maanden	7e keer
6 maanden	8e keer

Volwassen dieren 4 x per jaar

Ontwormingsschema volgens: European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; Worm Control in Dogs and Cats. ESCCAP Guidelines.



TIP: vergeet je pup niet te ontwormen en schrijf je in voor de Bayer reminder service:

EENVOUDIG AANMELDEN

1. REGISTREER je huisdier(en) op www.reminderservice.bayerpetcare.nl
2. KIES voor welke parasieten en met welke frequentie je HERINNERINGEN wilt ontvangen
3. ONTVANG GRATIS automatisch een reminder via e-mail en/of SMS



Welke ontwormingsmiddelen zijn er?

Meestal heb je niet door dat je hond wormen heeft. De ontwormingsmiddelen die op de Nederlandse markt zijn, werken doorgaans ook niet om wormen te voorkomen (preventief), maar zorgen ervoor dat als de hond wormen heeft, deze worden gedood (curatief).

Er zijn veel verschillende typen ontwormingsmiddelen. Je hebt ze als pil, vloeistof die ingenomen moet worden, als pasta en als pipet die in de nek toegediend wordt. Het is in beginsel aan te raden een breed spectrum ontwormingsmiddel te gebruiken. Dat wil zeggen dat het effectief is tegen de meeste wormsoorten.

Hieronder vind je meer informatie over de Bayer ontwormingsmiddelen (in alfabetische volgorde)

Drontal Pup

Voor de behandeling van de belangrijkste rondwormen bij pups en jonge honden.

Drontal® Pup is een vloeibaar ontwormingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor pups en jonge honden. Het doodt de belangrijkste spoel-, haak- en zweepwormen.



Voordelen:

- Speciaal ontwikkeld voor pups
- Breed spectrum: doodt spoel-, haak- en zweepwormen
- Gemakkelijke toediening (vloeistof)
- Geen leeftijdsbeperking
- Geen bijwerkingen

Dosering:

- Suspensie - 1 ml per kg lichaamsgewicht

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

Drontal (Large) Dog

Behandeling van de belangrijkste rond- en lintwormen bij de hond.

Drontal® Dog is een ontwormingsmiddel dat spoelwormen, lintwormen (o.a. de vlooienlintworm en de vossenlintworm) en haakwormen doodt na éénmalige toediening.

Nieuw! Drontal® Dog tasty 10 kg tabletten. Nu extra lekker - 9 van de 10 honden eet de tablet uit de hand!



Voordelen:

- Doodt spoel-, lint- en haakwormen
- Eénmalige toediening in de bek
- De tabletten kunnen met of zonder voedsel gegeven worden

Dosering:

- Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht
- Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht (= Drontal® Large Dog)

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

1. Bayer internal palability study 2008



Mansonil Pasta

Bestrijding van de belangrijkste rond- en lintwormen bij de hond.

Mansonil Pasta is een ontwormingsmiddel voor pups en kittens met een brede werking. Het doodt de belangrijkste rondwormen en lintwormen die bij pups kunnen voorkomen met een meerdaagse behandeling.

Voordelen:

- Speciaal ontwikkeld voor pups vanaf 2 weken
- Brede werking tegen rond- en lintwormen
- Gemakkelijk toe te dienen
- Geen bijwerkingen

Dosering:

De spuit is voorzien van maatstreepjes per kg lichaamsgewicht. De pasta kan rechtstreeks in de bek worden gegeven of gemengd worden door het voer. De behandeling moet 2 dagen achtereenvolgend worden gegeven bij spoel- of haakwormen en 3 dagen achtereenvolgend bij lintwormen.

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.



Mansonil All Worm (Large) Dog Flavour

Bestrijding en preventie van de belangrijkste rond- en lintwormen bij de hond.

Mansonil All Worm® Dog Flavour is een ontwormingsmiddel met een brede werking. Het doodt de belangrijkste rond- en lintwormen die bij de hond voorkomen na een éénmalige behandeling.

Nieuw! Mansonil® All worm tasty 10 kg tabletten. Nu extra lekker – 9 van de 10 honden eet de tablet uit de hand!

Voordelen:

- Brede werking tegen rond- en lintwormen
- Smakelijke tabletten

Dosering:

- Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg
- Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht (= Mansonil All Worm Large Dog Flavour)

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

1. Bayer internal palability study 2008



Bayer heeft ook pipetten/huiddruppels tegen wormen bij honden – vraag je dierenarts om advies:

- Voor honden/pups getroffen door, of vermoedelijk getroffen door, gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen en coccidiën
- De huiddruppels werken zowel tegen vlooiën, luizen en schurft alsook tegen diverse soorten wormen en mijten



VLOOIEEN EN TEKEN EN WAAROM PREVENTIEVE BEHANDELING HIERTEGEN ZO BELANGRIJK IS

Vlooien zijn de meest voorkomende parasieten bij huisdieren. Het zijn kleine insecten zonder vleugels, ongeveer 0,5 cm groot, met achterpoten die gemaakt zijn om te springen. Een klein deel van de levenscyclus van de vlo voltrekt zich op het huisdier. Volwassen vlooien voeden zich met bloed.

De eitjes worden op het dier gelegd, maar vallen er vaak af en komen in de omgeving (mand van het huisdier, vloerkleden) terecht. Slechts 5% van alle vlooien leeft op dieren – en 95% in de leefomgeving.

Honden kunnen door vlooien gebeten worden. De huidirritatie bij je dier als gevolg van de vlooienbeten kan leiden tot allergische dermatitis. Allergische dermatitis (FAD, Flea Allergy Dermatitis) is het gevolg van overgevoeligheid voor het speeksel van vlooien.

Zeer heftige vlooienplagen kunnen, vooral bij kleine dieren als pups, bloedarmoede tot gevolg hebben. Vlooien kunnen ook virale of bacteriële ziektes overbrengen.



Vloelarve



Vlo

Teken hebben acht (in plaats van zes) poten en hun lichaam bestaat maar uit twee delen.

Ixodes ricinus is de meest voorkomende teek in Nederland. Deze teek is over het algemeen te vinden in landelijke gebieden. Tekken hebben sterk ontwikkelde kaken waarmee ze een gat door de huid kunnen maken om zich met bloed te voeden. Op de aanhechtingsplek kunnen ze voor irritatie zorgen.



Teek

Waarom je puppy behandelen tegen vlooien en/of teken?

Om je hond, maar ook jezelf, gezond te houden, is het belangrijk dat je hem preventief behandelt tegen vlooien en teken. Vlooien en teken voeden zich door het bloed van de pup. Doordat ze zich hechten aan de huid bestaat de kans op ziektenoverdracht middels bloedcontact.

Teken en vlooien kunnen bloedarmoede veroorzaken als de besmetting ernstig en het dier jong is.

Het grootste gevaar in verband met teken zijn de ziektes die ze kunnen overbrengen, zoals ziekte van Lyme en Babesiose. In het buitenland kunnen dieren ook met Ehrlichiose besmet worden. Voor huisdieren die veel reizen, is een regelmatige tekenbehandeling dus geen overbodige luxe.

Wat zijn de symptomen?

Vlooien en teken zitten op de vacht van de hond. Honden die last hebben van vlooien zullen veelvuldig krabben met de poten. Vlooien zorgen vooral voor jeuk en (huid)irritatie bij de hond. Vlooien leggen tot wel 50 eitjes per dag, een plaag is dus zo gebeurd. Een hond zal een tekenbeet niet direct opmerken. Tekken dien je direct (liefst binnen 24 uur na aanhechting) te verwijderen met een tekenpen. Controleer je hond altijd op teken na het wandelen.

Hoe kan mijn hond vlooien en/of teken krijgen?

In het bos is het risico op een tekenbeet het grootst, maar ook in de eigen tuin of in de duinen is een tekenbeet best mogelijk. Dit betekent dus ook dat als je hond lekker in de tuin loopt rond te struinen hij een grote kans heeft om daar een tekenbeet op te lopen. Alhoewel teken het hele jaar kunnen voorkomen, zijn ze vooral in voor- en najaar erg actief. Tekken wachten hun gastheer op, hangend aan twijgjes en grashalmen of hoge planten.

Vlooien kunnen worden overgebracht van het ene dier op het andere, maar besmetting kan ook gewoon gebeuren vanuit de omgeving. In ernstige gevallen is behandeling van de omgeving nodig, omdat de vlooien anders steeds weer opduiken om zich op je huisdieren te nestelen; een dergelijke vlooienplaag kan maanden aanhouden.

Bij de behandeling van de omgeving is het van belang dat je alle plekken waar je huisdier komt, behandelt. Vergeet hierbij ook de auto niet.


Hoe vaak moet je een vlooien- of tekenbehandeling geven?

Vlooien en teken kunnen het hele jaar voorkomen. De meeste producten tegen vlooien en/of teken werken preventief tot 1 maand. Maar er bestaan ook halsbanden die tot 8 maanden werken. En voorkomen is beter dan genezen!

TIP: vergeet de vlooien en/of tekenbehandeling van je pup niet en schrijf je in voor de Bayer reminder service:

EENVOUDIG AANMELDEN

1. REGISTREER je huisdier(en) op www.reminderservice.bayerpetcare.nl
2. KIES voor welke parasieten en met welke frequentie je HERINNERINGEN wilt ontvangen
3. ONTVANG GRATIS automatisch een reminder via e-mail en/of SMS



Welke vlooien- en tekenmiddelen zijn er?

Er zijn veel verschillende typen geneesmiddelen tegen vlooien en/of teken. De meest gebruikte zijn pipetten (huiddruppels) of banden. De meeste vlooien- en teken-geneesmiddelen kan je pas inzetten vanaf een leeftijd van 7 tot 8 weken. Als de moeder van de pups goed behandeld is tegen vlooien en teken, hoeft dit ook geen probleem te zijn en is het risico op een vlooien- of tekenbeet heel klein. Er zijn ook shampoos of sprays op de markt die wel voor pups onder de 7 weken gebruikt mogen worden.

Hieronder vind je meer informatie over de Bayer geneesmiddelen tegen vlooien en/of teken (in alfabetische volgorde)

Advantage®

Preventie en behandeling van vlooien, vlooienlarven en luizen bij de hond (vanaf 8 weken).



Advantage® is een snelwerkend middel dat vlooien, vlooienlarven en luizen doodt. De toediening is eenvoudig: je druppelt de inhoud van de pipet tussen de haren van je hond op de intacte huid.

Voordelen:

- Doodt vlooien en vlooienlarven
- Doodt luizen
- Veilig bij puppies > 8 weken oud
- Beschermt 4 weken tegen vlooien
- Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid tussen de schouderbladen)*

* Bij honden boven de 25 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet gelijkmatig op 3 tot 4 plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 8 weken: maandelijks

- | | |
|----------------------------|--|
| • Honden < 4 kg | 1 pipet Advantage® 40 |
| • Honden tussen 4 - 10 kg | 1 pipet Advantage® 100 |
| • Honden tussen 10 - 25 kg | 1 pipet Advantage® 250 |
| • Honden tussen 25 - 40 kg | 1 pipet Advantage® 400 |
| • Honden > 40 kg | Gebruik de geschikte combinatie van pipetten |

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

Advantix®

Behandeling van vlooien, teken en bijtende luizen bij de hond (vanaf 7 weken).

Advantix is een snelwerkend middel dat gedurende vier weken werkt tegen vlooien en teken (3 weken voor Dermacentor reticulatus). Advantix doodt eveneens bijtende luizen. Daarnaast werkt Advantix ook afwerend tegen teken, muggen, zandvliegen en stalvliegen.



Voordelen:

- Afwerende werking*
- Snelle werking tegen vlooien
- Zeer brede werking: vlooien, teken, zandvliegen, stalvliegen, muggen en bijtende luizen
- Veilig bij puppies > 7 weken oud en > 1,5 kg gewicht (Advantix® 40)
- Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid tussen de schouderbladen)**

* De afwerende werking van Advantix voorkomt dat bijvoorbeeld een teek de hond kan bijten en verkleint daarmee de kans op ziekten-overdracht.

** Bij honden boven de 10 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 7 weken: maandelijks

- Honden < 4kg 1 pipet Advantix® 40
- Honden tussen 4 - 10 kg 1 pipet Advantix® 100
- Honden tussen 10 - 25 kg 1 pipet Advantix® 250
- Honden tussen 25 - 40 kg 1 pipet Advantix® 400
- Honden > 40 kg Gebruik de geschikte combinatie van pipetten

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

Bolfo Gold®

Bestrijding en preventie van vlooien en vlooienlarven bij de hond (vanaf 8 weken).

Bolfo Gold® is een snelwerkend middel dat vlooien en luizen doodt.

De toediening is eenvoudig: je druppelt de inhoud van de pipet tussen de haren van je hond op de intacte huid.



Voordelen:

- Doodt vlooien en vlooienlarven
- Doodt bijtende luizen
- Veilig bij puppies > 8 weken oud
- Beschermt 4 weken tegen vlooien
- Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid tussen de schouderbladen)*

* Bij honden boven de 25 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 8 weken: maandelijks

- Honden < 4kg 1 pipet Bolfo Gold® 40
- Honden tussen 4 - 10 kg 1 pipet Bolfo Gold® 100
- Honden tussen 10 - 25 kg 1 pipet Bolfo Gold® 250
- Honden tussen 25 - 40 kg 1 pipet Bolfo Gold® 400
- Honden > 40 kg Gebruik de geschikte combinatie van pipetten

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

Seresto®

Behandeling en preventie van vlooiën en teken bij honden (vanaf 7 weken).

Seresto® is een innovatieve halsband die na aanbrengen direct bescherming biedt tegen vlooiën en binnen twee dagen bescherming biedt tegen teken. Deze bescherming tegen vlooiën en teken houdt tot 8 maanden aan.



Voordelen:

- Tot 8 maanden bescherming tegen vlooiën en teken
- Afwerende werking tegen teken
- Geurloos

Dosering vanaf een leeftijd van 7 weken: om de 8 maanden


- Halsband kleine hond < 8 kg
- Halsband grote hond > 8 kg

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de verkorte bijsluiter achterin het boekje.

WERKING VLOOIENCYCLUS EN WAAROM DE BEHANDELING VAN DE OMGEVING ZO BELANGRIJK IS

Niks is zo vervelend als wanneer je hond vlooiën heeft. Wist je dat het grootste gedeelte van de vlooiencyclus zich afspeelt in je huis (de omgeving). Je vindt meestal alleen volwassen vlooiën in de vacht van het dier. En dat is slechts 5% van het probleem. Het merendeel van het vlooiënprobleem (95%) zit in de omgeving. Hierdoor komt je hond na behandeling telkens opnieuw in aanraking met vlooiën waardoor het probleem mogelijk terugkomt. Als je huisdier langere tijd onbehandeld in het huis heeft rondgelopen, bestaat de kans dat er veel larven en cocons in je huis verstopt aanwezig zijn. Het kan daarom nodig zijn ook de omgeving van het dier te behandelen.

Vlooiencyclus



Stappenplan vlooiënbehandeling

- Stap 1**  behandel het dier
- Stap 2**  ruim op en reinig
- Stap 3**  behandel de omgeving





LIJST MET VERKORTE BIJSLUITERS PER PRODUCT. VOOR DE VOLLEDIGE BIJSLUITER – ZIE VERPAKKING.

Advantage hond

Indicaties *Hond:* Voor de preventie en de behandeling van vlooiën en voor de behandeling van bijtende luizen (*Trichodectes canis*). Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooiënbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandlungsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. **Contra-indicaties** Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. **Bijwerkingen** Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden en katten ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. **Dosering** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooiën en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. *Hond:* Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Bij besmetting met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. **Verpakking** Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes. Registratienummers : REG NL 9211 (Advantage 40 voor honden), REG NL 9212 (Advantage 100 voor honden), REG NL 9213 (Advantage 250 voor honden), REG NL 9558 (Advantage 400 voor honden), - VRIJ .

Advantix (hond)

Advantix spot-on solution voor honden: Werkzame bestanddelen Imidacloprid: 100 mg/ml, Permethrine: 500 mg/ml **Doel diersoort** Honden **Indicaties voor gebruik** Voor de bestrijding en de preventie van een vlooiënbesmetting (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*). Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooiënbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandlungsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis (VAD). Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (*Rhipicephalus sanguineus* en *Ixodes ricinus* gedurende vier weken en *Dermacentor reticulatus* gedurende drie weken). Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen. Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (*Phlebotomus papatasi* gedurende twee weken en *Phlebotomus perniciosus* gedurende drie weken), tegen muggen (*Aedes aegypti* gedurende twee weken en *Culex pipiens* gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (*Stomoxys calcitrans*) gedurende vier weken. **Contra-indicaties** In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het product niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht. **Niet gebruiken bij overgevoeligheid** voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. **Niet gebruiken bij katten** (zie rubriek 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik). **Speciale waarschuwingen** voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is. Een vasthechting van individuele teken of beten door individuele zandvliegen of muggen zouden kunnen optreden. Om deze redenen kan een overdracht van besmettelijke ziekten door deze parasieten niet volledig uitgesloten worden indien de omstandigheden ongunstig zijn. Het product biedt echter een afwerende (anti-voedende) werking tegen teken, zandvliegen en muggen, vermijdt zo dat de afgeweerde parasieten een bloedmaaltijd nemen en vermindert zo het risico op 'Canine Vector-Borne Disease' (CVBD) transmissie (bv. Borrelis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniosis). Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden. Men dient erop toe te zien dat het product correct wordt toegediend, zoals beschreven in rubriek 4.9. In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden te worden. Niet gebruiken bij katten. Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten, die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan dit product. Het is belangrijk te verzekeren dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die met dit product werd behandeld. Zoek onmiddellijk diergeneeskundig advies indien dit gebeurt. Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden. Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor aquatische organismen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient Contact van het product met de huid, ogen of mond vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening. Na gebruik de handen grondig wassen. **Bijwerkingen** In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen. In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejang of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en stuip trekkingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf. Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend. **Dosering en wijze van toediening** De aanbevolen minimale dosis is: 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine. Registratienummer REG NL 106415 Kanalisatiestatus Vrij Naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. op genoemd adres.

Bolfo Fleegard

Fleegard Spray® Aerosol (AE) spuitbus, werkzame stoffen: cyfluthrin 0.04%, pyroproxifen 0.05% - Kanalisatie: vrij - toelatingsnummer 12325N Het bovenstaand product is van Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. op genoemd adres.

Bolfo Gold hond

Werkzame bestanddelen: Imidacloprid: 100 mg/ml **Doeldiersoort:** Honden **Indicaties:** preventie en behandeling van vlooiën en violarven bij honden. De op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na toediening. De éénmalige behandeling beschermt tegen een vlooiënbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. **Wijze van toediening:** enkel voor uitwendig gebruik. Speciale voorzorgsmaatregelen: niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Registratienummer REG NL 10048 Kanalisatiestatus Vrij Naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer B.V.,

Bolfo Mand en Tapijtspray

Bolfo Mand en Tapijt Spray® Aerosol (AE) spuitbus, werkzame stoffen: permethrin 0.25%, tetramethrin 0.05% - Kanalisatie: vrij - Toelatingsnummer 13946N. Alle bovenstaande producten zijn van Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. op genoemd adres.

Mansonil All worm (large) dog flavour

MANSONIL ALL WORM DOG FLAVOUR, tabletten voor honden. **Actieve bestanddelen:** Pyrantelmonaat: 144 mg Febantel: 150 mg Praziquantel: 50 mg **FARMACEUTISCHE VORM** Kluitvormige, in 2 gelijke helften deelbare tablet. **Doeldiersoort:** hond. **Indicaties voor gebruik** met specificatie van de doeldiersoorten Rondworm- en lintwormmiddel voor honden. Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door: Spectrum Wormspecies Spoelwormen *Toxocara canis* *Toxascaris leonina* Lintwormen *Echinococcus granulosus* *Echinococcus multilocularis* *Dipylidium caninum* *Taenia spp.* *Multiceps multiceps* *Mesocestoides spp.* *Haakwormen* *Uncinaria stenocephala* *Ancylostoma caninum* Zweepwormen *Trichuris vulpis*. **Contra-indicaties:** geen bekend. **Speciale waarschuwingen** voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: geen. **Speciale voorzorgsmaatregelen** voor gebruik bij dieren: geen. **Bijwerkingen** (frequentie en ernst): In zeer zeldzame gevallen kunnen er milde verschijnselen van het maagdarmkanaal (zoals braken) optreden. **Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:** wegens het ontbreken van veiligheidsstudies, is het aangeraden het product niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: niet gelijktijdig toedienen met een ander wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat. **Dosering en toedieningsweg:** één tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg. **Wijze van toediening:** orale toediening. De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend of vermengd in voeder. Dieetmaatregelen zijn niet nodig. **Behandelingsduur** Eénmalige toediening. **Overdosering** (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): een overdosering van 10 maal de aanbevolen dosis van het product werd zonder symptomen bij honden en pups verdragen. Naam vergunninghouder: Bayer B.V. Animal Health Division Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht. Nummer van de vergunning NL 10534, kanalisatie: vrij

Seresto hond

Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor honden ≤ 8 kg , Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg. **Actieve bestanddelen:** imidacloprid en flumethrine. **Indicaties:** Behandeling en preventie van vlooiënbesmettingen (Ctenocephalides) gedurende 7 tot 8 maanden. De werkzaamheid

tegen vlooiën start onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Beschermt tegen ontwikkeling van vlooiënlarven in de onmiddellijke omgeving van het dier gedurende 8 maanden. Seresto kan gebruikt worden als deel van een behandelingsstrategie tegen Vlooiën-allergiedermatitis (VAD). Het product heeft een persisterende acaricide (dodelijke) doeltreffendheid tegen tekenbesmettingen (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) en afwerende (anti-voedende) doeltreffendheid tegen tekenbesmettingen (Ixodes ricinus, Rhipicephalus) gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken. Het is mogelijk dat teken die reeds aanwezig waren op de hond vóór de behandeling, niet binnen de 48 u doodend worden na het aanbrengen van de halsband en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van besmettingen met nieuwe teken start binnen de twee dagen na het aanbrengen van de halsband. Behandeling van bijtende/zuigende luizenbesmettingen (*Trichodectes canis*). Idealiter zou de halsband aangebracht moeten worden voor het begin van het vlooiën- of tekenseizoen. **Contra-indicaties:** Puppies van minder dan 7 weken niet behandelen. **Niet gebruiken** in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen:** Occasioneel kan er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, een lichte jeuk en/ of roodheid waargenomen worden tijdens de eerste dagen na het aanbrengen. Zorg ervoor dat de halsband niet te strak zit. Ter hoogte van de toedieningsplaats kunnen zich licht haarverlies en milde huidreacties voordoen, wat doorgaans binnen 1 tot 2 weken verdwijnt zonder dat de halsband afgenomen moet worden. In bepaalde gevallen, kan het tijdelijk verwijderen van de halsband aangewezen zijn, totdat de symptomen verdwenen zijn. **Dosering:** Cutaan gebruik. Eén halsband per dier aan te brengen rond de nek. Honden van meer dan 8 kg krijgen één Seresto halsband van 70 cm lang. Kleine honden tot en met 8 kg lichaamsgewicht krijgen één Seresto halsband voor honden < 8 kg van 38 cm lang. Enkel voor uitwendig gebruik. Kanalisatie: Vrij

Mansonil pasta:

Mansonil Pasta, voor oraal gebruik. **Werkzaam bestanddeel** Flubendazol 44 mg **Hulpstoffen** Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1,8 mg Propylparahydroxybenzoaat (E 216) 0,2 mg. **Doeldiersoorten** Hond en kat. **Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten** Bij honden: spoelwormen: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*; zweepwormen: *Trichuris vulpis*; haakwormen: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*; lintwormen: *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*. Bij katten: spoelwormen: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*; haakwormen: *Ancylostoma tubaeforme*; lintwormen: *Taenia pisiformis*, *aenia taeniaeformis*. **Contra-indicaties** Geen bekend. **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren** Geen. **Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient** In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen. **Bijwerkingen (frequentie en ernst)** Speeksel, met name bij de kat. **Gebruik tijdens dracht of lactatie** Terughoudend betrachten aan het begin van de dracht. **Kanalisatiestatus: Vrij** REG NL 10137. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Bayer BV, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, www.companion.bayer.nl

Drontal® Dog flavour

Werkzame bestanddelen: 1 tablet bevat 50 mg praziquantel, 144 mg pyrantelmonaat, 150 mg febantel, artificiële 'Beef flavour'. • **Doeldier:** Hond. **Indicaties voor gebruik:** Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door spoelwormen (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*), lintwormen (*Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*), *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*), haakwormen (*Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*) en zweepwormen (*Trichuris vulpis*). **Contra-indicaties:** Niet combineren met piperazine. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5kg. In afwachting van verdere proeven tijdens de vroege drachtperiode, is het aangeraden Drontal niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht. **Bijwerkingen:** Geen bekend. **Dosering en wijze van toediening: DOSERING** 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelmonaat en 15 mg febantel per kg lichaamsgewicht. **WIJZE VAN TOEDIENING** Orale toediening. De tabletten kunnen direct aan de honden worden toegediend of vermengd in voeder. Dieetmaatregelen zijn niet nodig. **BEHANDELINGSDUUR** Eénmalige toediening. REG NL 8983 rij

